Anwendungsbericht MOMOSAN®

BEHANDLUNG DES ISCHÄMISCHEN FUSSES

DIABETISCHE NEUROPATHIE



Veröffentlicht in:
ACTA VULNOLOGICA

Autor: Krankenpfleger Leonardo Cosimo NITTI
Abteilung für Intensivmedizin (IRCCS, S. de Bellis Castellana Grotte BA, ITALIEN)
Leiter Dr. Francesco GABRIELE

Einleitung: Patient, männlich, 60 Jahre. Seit zehn Jahren Diabetes, Adipositas.
Aus der Anamnese geht hervor, dass während der Arbeit (LKW-Fahrer) 15 Stunden am Tag Sandalen getragen wurden. Aufgrund der Neuropathie (anästhetischer Fuß) bemerkte der Patient nicht das Auftreten von multiplen Läsionen am linken Fuß. Seit zwei Wochen in ambulanter Behandlung wegen Diabetes.
Diagnose: Diabetische Neuropathie.
Medikamentöse Therapie: Antibiotika und Ausgleich der Blutzuckerwerte.

Behandlung:

Débridement mit proteolytischen Enzymen und Auflegen von Polyurethan mit Wabenstruktur schwarz 15X10X1cm auf die Läsionen. Abdeckung mit Polyurethan mit Wabenstruktur weiß 15X10X-1cm für drei Wochen mit Wechsel alle 48-72 Stunden. Nachfolgende Verbände mit Polyurethan mit Wabenstruktur weiß 15X10X1cm in Kontakt mit der Läsion, fixiert mit Polyurethanverband mit Wabenstruktur 300X5X0,3cm bis zur Heilung.

Ergebnis: Heilung nach 90 Behandlungstagen.

Verwendete Materialien:

- Proteolytische Enzyme

(VERSCHIEDENE TYPOLOGIEN);

- Polyurethanverbände mit Wabenstruktur schwarz (MOMOSAN) steril 15X10X1cm;
- Polyurethanverbände mit Wabenstruktur weiß (MOMOSAN) steril 15x10x1cm;
- Rollenverbände aus Polyurethan

mit Wabenstruktur weiß (MOMOSAN) unsteril 300x5x0,3cm;

DISKUSSION:

Der beschriebene klinische Fall zeigt den kritischen Aspekt in Zusammenhang mit dem Schweregrad der ischämischen Erkrankung, dem fortgeschrittenen Lebensalter und dem schlechten Ernährungszustand, die zusammen mit der Ablehnung der empfohlenen chirurgischen Therapie die erreichten Ergebnisse unterstreichen. Diese können als hervorragend erachtet werden, auch weil sie in der Wohnung der Patienten durch einen im Bereich der Wundbehandlung spezialisierten Krankenpfleger erreicht wurden.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Fall in einem relativ kurzen Zeitraum gelöst wurde, hebt dieser Bericht die Wichtigkeit der Verwendung von Polyurethanverbänden mit Wabenstruktur (MOMOSAN) hervor, die in der Lage sind, im Vergleich zu anderen Hilfsmitteln die Läsionen mit niedrigen Anwendungskosten zu behandeln.

Patient: männlich, 60 Jahre, seit zehn Jahren Diabetes, Adipositas.

Anwendungserfahrung MOMOSAN®