Anwendungsbericht MOMOSAN®

Diabetische Neuropathie

Inf. Leonardo C. NITTI
(Wound care specialist nurse)
Dipartimento di Terapia Intensiva
(IRCCS S. de Bellis Castellana Grotte)
Direttore
Dott. Francesco GABRIELE

Anamnese: 60 jähriger Patient Diabetisch seit 10 Jahren, fettsüchtig. Lastwagenfahrer, trug Sandalen 15 Stunden am Tag, spürte keinen Schmerz, multiple Wunden am linken Fuß. Seit zwei Wochen in Behandlung in einem Ambulatorium für Diabetiker.

Diagnose: Diabetische Neuropathie

Medizinische Therapie: Antithrombotika, Antibiotika und lokale Behandlung mit Wundauflagen.

Behandlung: Debridement mit proteolytischen Enzymen plus schwarzer Polyurethanschaumverband MOMOSAN® 15x10x1cm direkt auf die Verletzungen, Verband mit weißem Polyurethanschaum MOMOSAN® 15x10x1cm für drei Wochen. Die Wundauflagen wurden alle 2/3 Tage gewechselt, danach wurden weiter Wundauflagen aus weißem Polyurethanschaum MOMOSAN® 15x10x1 cm direkt auf die Wunden gelegt und mit einen PU-Schaumverband MOMOSAN® 300x5x0,3cm fixiert.

Ergebnis:
Heilung nach 90 Tagen Behandlung.

Verwendetes Material:
-Proteolytische Enzyme (verschiedene Typologien).
-Wundauflagen aus sterilem, schwarzem Polyurethanschaum MOMOSAN® 15x10x1cm
-Wundauflagen aus sterilem, weißem Polyurethanschaum MOMOSAN® 15x10x1cm
-Verbandrollen aus nicht sterilem, weißem Polyurethanschaum MOMOSAN® 300x5x0,3cm

Diskussion: Unter Berücksichtigung der Kritizität des klinischen Falles mit korrelativer schwerer Pathologie, das fortgeschrittene Alter, bei denen die empfohlene chirurgische Therapie von der Patientin abgelehnt worden ist, sind die erhaltenen Ergebnisse hervorragend, auch weil die Wundtherapie zu Hause bei der Patientin von einem in Wound Care spezialisierten Krankenpfleger durchgeführt worden ist. Unter Berücksichtigung der extremen Schwere dieses Falles, hat sich dieser in relativ kurzer Zeit und zu mäßigen Kosten gelöst. Es wurden kostengünstige Materialien der neusten Generation und nicht invasive Techniken verwendet.

References: 1)EPUAP Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide 2009. 2)European Wound Management Association (EWMA). Positionierungsdokument: Die topische Unterdruck bei der Wundbehandlung. London: MEP Ltd, 2007. 3) Armstrong DG, Lavery LA; Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2005 Nov 12;366(9498):1704-10); polyurethane medications is MOMOSAN.

MOLTOPLAST® GmbH healthcare · Egger-Lienz-Straße 130 · A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0)512 / 58 54 07 · Fax: +43 (0)512 / 58 54 07-18 · med@moltoplast.com · www.momosan.com