Anwendungsbericht


MOMOSAN

Morbus Crohn, Colostoma, Peritonitis





Nach der Operation Abdeckung mit ☐☐☐☐☐☐☐N® weiss (24x16x1cm) und Anbringen der NPWT ("THESIS").



Kontrolle nach 4 Tagen.









3. Anwendung mit $\text{MOMOSAN}^{\text{@}}$ schwarz

nach weiteren 5 Tagen 4. Anwendung










6. Anwendung nach weiteren 5 Tagen


Kontrolle nach weiteren 7 Tagen, Wunddehiszenz gereinigt, Wunde granuliert sehr schön.





Kontrolle nach weiteren 8 Tagen, weiterführende Behandlung mit MOMOSAN® weiss in Verbindung mit NPWT ("THESIS").





Sehr schöner Heilungsverlauf, Vergleich nach 50 Tagen.

Vorher

Nachher

ZUSAMMENFASSUNG:

Unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung von sehr kritischen Patienten ist das Ergebnis als hervorragend zu betrachten.

Die Anwendung von MOMOSAN® weiss und MOMOSAN® schwarz ist hervorragend geeignet in Verbindung mit NPWT-Systemen, beste Resultate zu erzielen.

Anwendungserfahrung NPW1

Intensivmedizin Krankenhaus

Castellana Grotte

Dr. F. Gabriele

S. de Bellis