Anwendungsbericht MOMOSAN®
schwerer Gefäßverschluss

Intensivmedizin
Krankenhaus
S. de Bellis
Castellana Grotte
Dr. F. Gabriele

Beginn der Behandlung mit MOMOSAN® schwarz
in Verbindung mit NPWT („THESIS").



Kontrolle nach 4 Tagen und weiterführende Behandlung mit MOMOSAN® weiss
in Verbindung mit NPWT („THESIS").

Vorher Nachher

Vergleich nach weiteren
35 Tagen Behandlung

ZUSAMMENFASSUNG:
Unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung von sehr kritischen Patienten ist das Ergebnis als hervorragend zu betrachten.

Die Anwendung von MOMOSAN® weiss und MOMOSAN® schwarz ist hervorragend geeignet in Verbindung mit NPWT-Systemen, beste Resultate zu erzielen.

Patient: Subarachnoidalblutung

Anwendungserfahrung NPWT mit MOMOSAN®

MOLTOPLAST® GmbH healthcare · Egger-Lienz-Straße 130 · A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0)512 / 58 54 07 · Fax: +43 (0)512 / 58 54 07-18 · med@moltoplast.com · www.momosan.com