Anwendungsbericht

Klinikum Forchheim, Deutschland - Dr. Adler

MOMOSAN®

Patient: mit Fersennekrose bei Polyneuropathie bei Diabetes

Anwendungserfahrung MOMOSAN®

Patient mit Fersennekrose bei Polyneuropathie bei Diabetes

Fersennekrose fortschreitende nach erstmaliger Exzision und primärer Behandlung mit NPWT Wiederaufnahme

Lokale Exzision und Debridement

Bis zum Fersenbein reichende Nekrose

Ausgeprägte Fibrinbeläge im Bereich des Weichteildefektes. Beginnende Granulation im Bereich des Fersenbeines.

Weiterer Verbandwechsel mit MOMOSAN weiss

Lokal gute Granulation

Im weiteren Verlauf guter Granulationsgrund. Bei dem dementen Patienten mit ausgeprägter Polyneuropathei war letztlich dennoch eine Unterschenkelamputation bei erneuter Druckentlastung und nicht realisierbarer konsequenter Entlastung erforderlich.

MOLTOPLAST® GmbH healthcare · Egger-Lienz-Straße 130 · A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0)512 / 58 54 07 · Fax: +43 (0)512 / 58 54 07-18 · med@moltoplast.com · www.momosan.com